

1.- Escolar con antecedente de resfriado común, con dolor en hemiabdomen inferior a predominio de FID y 48 horas de evolución, presenta fiebre de 39.8°C, malestar general. Al Examen físico: garganta congestiva, Mac Burney positivo, signo de rebote positivo. Exámenes de laboratorio: leucocitosis con linfocitosis relativa, sin desviación izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A.- Infección urinaria
- B.- Divertículo de Meckel
- C.- Adenitis mesentérica
- D.- Litiasis renal
- E.- Apendicitis aguda

2.- La disfunción que se desarrolla por efecto tóxico de los aminoglucósidos en el sistema nervioso central se presenta a nivel de:

- A.- Coclear y olivar
- B.- Cerebeloso y vestibular
- C.- Vestibular y coclear
- D.- Talámico y cortical
- E.- Hipotalámico y talámico

3.- En que porcentaje puede disminuir el peso de un recién nacido a término en la primera semana?

- A.- 14
- B.- 16
- C.- 10
- D.- 12
- E.- 18

4.- Mujer de 25 años con amenorrea de 8 semanas, que desde hace 8 horas presenta dolor en FID muy intenso y de inicio brusco, continuo y con compromiso del estado general. Al Examen de abdomen: signos peritoneales. Laboratorio: 12,000 Hb 8 gr/dl ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A.- Quiste de ovario a pedículo torcido
- B.- Apendicitis aguda complicada
- C.- Enfermedad inflamatoria pélvica
- D.- Volvulo de ciego
- E.- Embarazo ectópico roto

5.- ¿En cuál de las siguientes patologías se encuentra esplenomegalia masiva?

- A.- Mielodisplasia
- B.- Tuberculosis esplénica
- C.- Sepsis
- D.- Insuficiencia cardiaca congestiva
- E.- Linfomas

6.- En el embarazo normal, la altura del fondo uterino en centímetros guarda una relación cercana con la edad gestacional entre las semanas:

- A.- 13-19
- B.- 35-36
- C.- 37-38
- D.- 20-34
- E.- 39-42

7.- Mujer de 25 años sufre accidente de tránsito. En emergencia se constata: Funciones vitales estables y fractura de rama ísquio púbica derecha que compromete vejiga en su porción extra peritoneal. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

- A.- Laparotomía exploratoria
- B.- Colocación de sonda Foley
- C.- Talla vesical
- D.- Citostomía suprapúbica
- E.- Reparación endoscópica

8.- Gestante de 35 años, G3 P0212, EG: 16 semanas por FUR confiable, quién acude al Puesto de Salud para atención prenatal. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para transferencia de atención por el especialista?

- A.- Parto prematuro previo
- B.- Multiparidad
- C.- Antecedente de aborto
- D.- Muerte neonatal previa
- E.- Gestante añosa

9.- Neonato de 7 días con antecedente de varicela materna una semana antes del parto con lesiones diversas en piel. ¿Cuál es el tratamiento indicado?

- A.- Cefotaxime
- B.- Cefotaxime
- C.- Aciclovir
- D.- Foscarnet
- E.- Ganciclovir

10.- Mujer de 31 años, refiere sensación inminente de micción, pero no alcanza llegar al baño, presentando escape involuntario de orina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A.- Incontinencia urinaria de urgencia
- B.- Incontinencia urinaria continua
- C.- Incontinencia urinaria de esfuerzo
- D.- Disfunción del vaciado vesical
- E.- Fístula genitourinaria

11.- Escolar de 8 años, se le diagnostica por ecografía un quiste ovárico unilocular de 5 cm con tabique fino. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- A.- Anticonceptivos orales
- B.- Cariotipo
- C.- Observar 2-3 meses
- D.- Gonadotrofina coriónica humana
- E.- Alfafetoproteína

12.- Varón de 65 años que acude a Emergencia, porque hace 6 horas presenta alza térmica, escalofríos, ictericia y dolor espontáneo en cuadrante superior derecho del abdomen. Posteriormente tos seca. Antecedente de Diabetes y coleditiasis. RX Abdomen: hemidiafragma derecho elevado. Examen físico: dolor a la palpación en el hipocondrio derecho, no se palpan masas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A.- Absceso piógeno
- B.- Quiste hidatídico complicado
- C.- Absceso amebiano
- D.- Hepatocarcinoma complicado
- E.- Hematoma subcapsular hepático

13.- En la regla de Naegele que se utiliza para calcular la fecha probable del parto, al primer día de la fecha de la última menstruación (FUM) se le agrega...días y se resta...meses

- A.- 12 - 3
B.- 10 - 3
C.- 7 - 3
D.- 7 - 4
E.- 8 - 4

14.- Es una característica principal de los determinantes estructurales sociales de la salud

- A.- La actuación a nivel comunitario
B.- Incidencia en el nivel primario de atención
C.- La integralidad en salud
D.- La actuación a nivel familiar
E.- La inequidad en salud

15.- ¿En qué zona de la glándula prostática es más frecuente el cáncer?

- A.- Uretral
B.- Posterior
C.- Anterior
D.- Central
E.- Periférica

16.- Gestante de 35 semanas, con control prenatal a las 12 semanas teniendo PA: 110/70 mm Hg. Acude por presentar cefalea tipo latido, visión borrosa y con PA: 140/90 mm Hg, que se confirma 6 horas después; proteinuria: 300 mg en muestra al azar y recuento de plaquetas: 200,000. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A.- Pre eclampsia severa
B.- Hipertensión crónica
C.- Síndrome de HELLP
D.- Pre eclampsia leve
E.- Hipertensión gestacional

17.- Paciente senil, hospitalizado por bronquiectasias infectadas con Pseudomona aeruginosa. ¿Cuál de los siguientes antibióticos se indica?

- A.- Amoxicilina+Ácido clavulínico
B.- Doxicilina
C.- Piperacilina / Tazobactam
D.- Azitromicina
E.- Trimetropin+Sulfometoxazol

18.- Varón de 35 años que presenta bruscamente fiebre, cefalea, náuseas y vómitos. Al Examen físico: T:38.5°C, rigidez de nuca, letargo y confusión. La tinción de gram de LCR revela microorganismos intracelulares Gram negativos. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección?

- A.- Clindamicina 600 mg IV cada 8 horas
B.- Ceftriazona 2 gr. IV cada 12 horas
C.- Meropenem 1 gr. IV cada 8 horas post cultivo
D.- Ciprofloxacina 200 mg IV cada 8 horas
E.- Oxifloxacina 400 mg V cada 6 horas

19.- Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta en adultos?

- A.- Varices esofágica
B.- Desgarro de Mallory-Weiss
C.- Esofagitis erosiva
D.- Úlcera péptica
E.- Cáncer gástrico

20.- Mujer de 34 años nulípara no fumadora, acude a la consulta solicitando anticonceptivos orales combinados ¿Cuál es su opinión al respecto?

- A.- Hay riesgo incrementado de adquirir cáncer de ovario
B.- Tiene un riesgo aumentado de cáncer de mama
C.- Tiene un riesgo alto de infarto de miocardio
D.- Tiene riesgo de tromboembolismo
E.- Es una buena candidata para usarlo

21.- Adolescente de 16 años, que acude a consulta por presentar amenorrea primaria. Al Examen físico: desarrollo de caracteres sexuales secundarios normales para su edad y presencia de tabique vaginal y vagina doble. ¿En que otro aparato se espera encontrar malformación concomitante?

- A.- Óseo-muscular
B.- Cardiovascular
C.- Urinario
D.- Respiratorio
E.- Digestivo

22.- Escolar con rinorrea persistente que dura más de una semana después de un resfrío. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es la más probable?

- A.- Traqueobronquitis
B.- Infección a germen atípico
C.- Bronquitis
D.- Sinusitis
E.- Laringotraqueítis

23.- Varón de 54 años, indigente e historia de ingesta de bebidas alcohólicas, que ingresa a Emergencia con historia de malestar general, sensación de alza térmica, tos con expectoración purulenta y dolor en hemitorax derecho. Al Examen físico: FC: 98 x', FR: 25 x', T: 38.6 °C, PA: 80/55 mm Hg. Y crepitantes en 1/3 medio de HTD. ¿Cuál es la primera actitud frente al paciente?

- A.- Solicitar evaluación para admisión en cuidados intensivos
B.- Solicitar hemocultivo
C.- Fluidoterapia
D.- Metamizol 1gr. IM stat
E.- Iniciar apoyo vasopresor por bomba de infusión

24.- Mujer de 45 años, con antecedente de dispepsia a las grasas de varios años, presenta dolor tipo cólico en hipocondrio derecho que cede con antiespasmódicos. Acude a Emergencia por persistencia del dolor y distensión abdominal, náusea, vómitos y flatulencias. Rx simple de abdomen: aerobilia, asas delgadas dilatadas y niveles hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A.- Ileo funcional
B.- Colecistitis Aguda
C.- Ileo biliar
D.- Bridas y adherencias
E.- Pancreatitis Aguda

25.- Respecto a la vacuna de Virus Papiloma Humano, se puede afirmar que:

- A.- Se requieren 4 dosis de la vacuna bivalente
B.- Tiene una eficacia del 85 % para prevenir la infección persistente
C.- La vacuna tetravalente requiere dosis de refuerzo al año de la primeradosis
D.- La vacuna bivalente protege contra el cancer cervicouterino
E.- La vacuna no es eficaz para prevenir la persistencia de la infección por PVH

26.- Cuál de los siguientes síntomas acompaña con menos frecuencia los ataques de migraña?

- A.- Vértigo
B.- Náuseas
C.- Fotofobia
D.- Vómito
E.- Convulsión

27.- Varón de 20 años, sufre trauma facial severo con compromiso de órbita. Al Examen: destellos y escotomas en campo visual, horas después presenta disminución de la agudeza visual. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A.- Neuritis transitoria
B.- Desprendimiento de retina
C.- Neuritis traumática
D.- Proctosis
E.- Degeneración macular

28.- En un Centro de Salud cuya población menor de 3 años es de 450 niños, y es abastecido con una dotación de 450 cajas de chispitas (multimicronutrientes), la acción a seguir será darles a...

- A.- los que tienen Hg menor de 11 mg%
B.- los que no son obesos
C.- los que tienen desnutricion
D.- todos los niños entre los 6 y 36 meses
E.- todos los niños del distrito

29.- Varón de 35 años con sintomatología ulcerosa de varios años. Se realiza endoscopia alta, encontrándose lesión ulcerada en la mucosa del cuerpo gástrico y otra a nivel duodenal. Según la clasificación de Johnson. ¿A qué grado de úlcera péptica corresponde?

- A.- IV
B.- II
C.- III
D.- I
E.- V

30.- Recién nacido de 4 días, por parto domiciliario que rechaza la lactancia y presenta vómitos desde hace 2 días. Al Examen físico: T: 35.5 °C, FR: 75', FC : 160'; palidez, aleteo nasal y quejido, MV normal, no estertores y distensión abdominal. Cuál es el diagnóstico más probable?

- A.- Sepsis neonatal
B.- Aspiración meconial
C.- Neumonía
D.- Gastritis aguda
E.- Gastroenteritis

31.- El trastorno ginecológico más frecuente de la infancia es:

- A.- Vulvovaginitis
- B.- Eritema vulvar
- C.- Himen imperforado
- D.- Hemangioma
- E.- Traumatismos genital

32.- Las ramas de los nervios raquídeos que forman el plexo cervical son:

- A.- Antero lateral
- B.- Posteriores
- C.- Anteroposterior
- D.- Laterales
- E.- Anteriores

33.- Se define como RN de muy bajo peso al nacer al que que tiene un peso menor de...gr.:

- A.- 2800
- B.- 2000
- C.- 2500
- D.- 1800
- E.- 1500

34.- Gestante de 25 años, con 38 semanas de gestación, concurre por presentar contracciones uterinas regulares desde hace 2 horas, no refiere pérdida de líquido amniótico. Al Examen obstétrico: dilat.: 2 cm, borrado, altura de presentación: 0. Monitoreo electrónico: línea de base de 145 latidos por min, sin desaceleraciones. Cuál es la indicación?

- A.- Terminar el parto por cesárea
- B.- Suministrarle un analgésico
- C.- Caminar durante 2 horas y regresar para reevaluación
- D.- Masaje del fondo uterino
- E.- Estimulación con oxitocina

35.- Un lactante normal generalmente triplica su peso de nacimiento a los...meses

- A.- 12
- B.- 10
- C.- 8
- D.- 24
- E.- 9

36.- Pre escolar de 3 años, ingresa a emergencia por ingesta de lejía. Examen clínico: nauseoso, vomitando, con dolor abdominal intenso, abundante sialorrea, pálido y boca con gran eritema. ¿Cuál es el manejo inicial?

- A.- Neutralización
- B.- Lavado gástrico
- C.- Soporte vital
- D.- Antibióticos
- E.- Inducir vómitos

37.- Estibador de 48 años, presenta hace 6 meses tumoración blanda en región inguinal derecha, reductible, es intervenido quirúrgicamente por hernioplastia. El cirujano encuentra un saco herniario directo. ¿Cuál es el manejo quirúrgico más recomendado?

- A.- Invaginacion
- B.- reseccion
- C.- refuerzo
- D.- sin tratamiento
- E.- ligadura

38.- Mujer de 65 años que presenta una masa tumoral en la mama izquierda, fija a la pared toraxica, y ganglios palpables en la región axilar ipsilateral. En la evaluación inicial de la paciente se debe incluir...

- A.- ultrasonido
 B.- aspiración con aguja fina
 C.- biopsia excisional
 D.- biopsia incisional
 E.- tomografía axial computarizada

39.- En relación a la salud familiar, se puede precisar que

- A.- El genograma es una representación gráfica de la familia y es un instrumento prescindible en la atención familiar
 B.- El APGAR familiar es un cuestionario con el que se obtiene en forma rápida y sencilla la descripción familiar
 C.- El estudio de la red social es imprescindible para la práctica de la atención familiar
 D.- Las etapas del ciclo vital familiar son al azar, por lo que su conocimiento no permite realizar actividades preventivas
 E.- Los problemas psicosociales no intervienen en las crisis o disfunción familiar

40.- Mujer de 28 años con G3 P3003, consulta por flujo vaginal con mal olor después de tener relaciones sexuales. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de vaginosis bacteriana?

- A.- Cultivo de la secreción vaginal
 B.- Ph > de 4.5 y secreción blanquecina grumosa
 C.- Secreción gris homogénea y ph > de 4.5
 D.- Test de aminas + y ph > 4.5
 E.- Test de aminas + y aumento de leucocitos en el estudio de lamina

41.-Cuál de los siguientes gérmenes es el causante de forunculosis?

- A.- Bacillus anthracis
 B.- Bartonella bacilliformis
 C.- Estafilococcus aureus
 D.- Clostridium perfringens
 E.- Estreptococcus pyogenes

42.- Lactante de 2 años que llega a Emergencia por presentar tos perruna, afonía. Examen clínico: ansioso con estridor inspiratorio en reposo y tiraje subcostal. ¿Cuál es el tratamiento indicado?

- A.- Humidificación de la vía aérea
 B.- Corticoide inhalatorio
 C.- Corticoide endovenoso
 D.- Oxígeno terapia, O2 frío nebulizado
 E.- Nebulización con adrenalina

43.- Varón de 60 años con dolor abdominal cólico y desde hace tres días se localiza en fosa iliaca y flanco izquierdo, estreñimiento y malestar general. Al Examen físico: abdomen no distendido, dolor a la palpación superficial, ruidos hidroaéreos alejados y se esbozan signos peritoneales. Diagnostico diverticulitis no complicada ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección?

- A.- Colostomía en asa
 B.- Colostomía Hartmann
 C.- Colectomía total
 D.- Hemicolectomía izquierda
 E.- Sigmoidectomía

44.- Chofer de 45 años, que periódicamente presenta salida de secreción fétida por orificio a un centímetro del ano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A.- Forúnculo
- B.- Hemorroides
- C.- Fisura
- D.- Absceso
- E.- Fístula

45.- Lactante de 6 meses, adelgazado. Examen físico: craneotabes, crecimiento palpable de uniones condrocostales y engrosamiento de muñecas y tobillos. ¿Cuál es la deficiencia vitamínica que presenta?

- A.- B12
- B.- E
- C.- C
- D.- D
- E.- A

46.- Mujer de 55 años, con Diabetes mellitus tipo 2, de 10 años de evolución con tratamiento habitual con Metformina y Sitagliptina, con ejercicio escaso y dieta adecuada. Sus controles han pasado de glicemias basales de 110-140 a 170-200, Hb glicosilada: 8.5%. ¿Cuál es el tratamiento indicado?

- A.- Aumentar ingesta de proteínas
- B.- Sustituir Metformina por Glimpirida
- C.- Asociar al tratamiento Ascarboza
- D.- Asociar al tratamiento una dosis de Insulina basal
- E.- Sustituir Sitagliptina por Pioglitazona

47.- Mujer de 25 años, que acude por dolor intenso hipogástrico y fiebre de 4 días. Al Examen clínico: T: 38°C, dolor a la descompresión de hemiabdomen, dolor uterino y a la movilización cervical, no masas anexiales. ¿Cuál es el grado de enfermedad pélvica inflamatoria?

- A.- III b
- B.- I
- C.- II
- D.- III a
- E.- IV

48.- Recien nacido de 36 semanas, bajo peso al nacer, presenta labio leporino y paladar hendido, microcefalia, microftalmia, frente inclinada hacia atrás, comunicación interventricular, clinodactilia en manos y pies. Cuál es la alteración genética que presenta?

- A.- Trisomía 21
- B.- Síndrome de Pierre Robin
- C.- Trisomía 18
- D.- Trisomía 13
- E.- Deleción de 5p

49.- Mujer de 40 años, con 72 kg de peso, con dosaje de creatinina de 2.5 mg/dL. Según la ecuación de Cockcroft-Gault su depuración de creatinina en ml/min, es:

- A.- 40
- B.- 34
- C.- 17
- D.- 80
- E.- 60

50.- Se desea determinar la opinión que tienen los pobladores acerca de la vacunación. ¿Cuál es el muestreo indicado para este tipo de estudio?

- A.- Estratificado
- B.- Aleatorio simple
- C.- Accidental
- D.- Conglomerados
- E.- Por saturación

51.- Varón de 34 años, es traído a la emergencia por los bomberos en estado de inciencia . Medico confirma que se encuentra en parocardiorespiratorio e inicia la reanimación cardiorrespiratorio. Si el medico se encuentra solo. ¿Cuál es la relación correcta entre el numero de insuflaciones pulmonares y el numero de compresiones del tórax?

- A.- 3/30
- B.- 1/30
- C.- 3/20
- D.- 2/30
- E.- 2/20

52.- Varón de 21 años, que acude a Emergencia, por presentar dolor en hombro derecho. Al Examen físico: deformidad, bloqueo articular y signo de la charretera. ¿Cuál es el nervio probablemente lesionado?

- A.- radial
- B.- axilar
- C.- cubital
- D.- musculo cutáneo
- E.- mediano

53.-Cuál de las siguientes condiciones causa hipocalcemia?

- A.- Insuficiencia suprarrenal
- B.- Inmovilizacion
- C.- Agenesia paratiroidea
- D.- Ingesta de vitamina A
- E.- Feocromocitoma

54.- ¿Cuál es el antineoplásico alquilante cuyo mecanismo de acción es la interacción directa con el DNA?:

- A.- 6 - Mercaptopurina
- B.- Citarabina
- C.- Ciclofosfamida
- D.- 5 - Fluouracilo
- E.- Vincristina

55.- El Periodo de Incubacion del sarampion es de...días

- A.- 14 ? 21
- B.- > 14
- C.- 1 ? 3
- D.- 3 ? 7
- E.- 8 ? 12

56.- De acuerdo con la intervención del investigador. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de estudio observacional?

- A.- meta analisis
- B.- ensayo controlado concurrente
- C.- ensayo no controlado
- D.- cohorte
- E.- ensayo controlado secuencial

57.- El estímulo respiratorio central más intenso se deriva de la...

- A.- Acidosis
- B.- Hipercapnea
- C.- Hipoxia
- D.- Alcalosis
- E.- Hipovolemia

58.- Según la clasificación de Tanner en el varón, en el estadio III se presenta:

- A.- Engrosamiento peneano
- B.- Vello en base del pene
- C.- Escroto laxo
- D.- Testículo de 1 a 2 cm
- E.- Botón mamario

59.- Mujer de 20 años, con cesárea por inducción fallida. Al tercer día de puerperio presenta malestar general, fiebre y loquios fétidos. Al Examen clínico: T: 39°C, útero subinvolucionado y doloroso a la palpación, secreción fétida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A.- Dehiscencia de la histerorrafia
- B.- Endometritis puerperal
- C.- Absceso de pared abdominal
- D.- Retención de restos placentarios
- E.- Necrosis isquémica de mioma uterino

60.- Pre escolar de 3 años con dolor de garganta y fiebre desde hace 3 días. Examen físico: T: 38.2°C, faringe enrojecida, hipertrofia y edema amigdalares con exudado blanco amarillento, ganglios cervicales crecidos y dolorosos. ¿A que tipo de faringitis corresponde?

- A.- Coxsackie virus
- B.- Estreptocócica
- C.- Por adenovirus
- D.- Linfonodular
- E.- Virus de Epstein Barr

61.- Mujer de 40 años con antecedente de dispepsia a grasas, que hace 12 horas presenta dolor tipo cólico continuo en hemiabdomen superior y sensación de alza térmica. Al Examen físico: ictericia de escleras. Abdomen: Dolor a la palpación en hipocondrio derecho, Murphy positivo, RHA escasos, leucocitos : 18,000 con 9 abastados. Ecografía: vesícula biliar distendida y pared engrosada e imagen de cálculo en bacinete, ¿Cuál es la conducta a seguir?

- A.- Cirugía urgente
- B.- Hidratación
- C.- Antibiótico terapia
- D.- Antiespasmódico
- E.- Cirugía electiva

62.- Mujer de 48 años, que acude por hipermenorrea de 1 año de evolución. Al Examen clínico: útero aumentado de consistencia y volumen comparable a gestación de 14 semanas. Cuál es el diagnóstico más probable?

- A.- Mioma subseroso
- B.- Mioma intraligamentario
- C.- Mioma submucoso
- D.- Mioma cervical
- E.- Mioma intramural

63.- Los ácidos biliares se almacenan y concentran en la vesícula biliar luego se vierten al duodeno en respuesta a la liberación de colesistocinina estimulada por una comida. El 80 % de ácidos biliares conjugados se absorben de manera activa en:

- A.- Duodeno
- B.- Colon transverso
- C.- Colon ascendente
- D.- Íleon
- E.- Yeyuno

64.- R.N. presenta protusión de tejido en forma de racimo de uvas a través de la vagina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A.- Rectocele
- B.- Condilomatosis genital
- C.- Prolapso uterino
- D.- Prolapso vaginal
- E.- Sarcoma Botrioides

65.- ¿Cuál de los siguientes hallazgos es un criterio importante para el diagnóstico de endocarditis infecciosa?

- A.- Tomografía computarizada cardíaca
- B.- Fiebre de 38°C por más de dos semanas
- C.- Hemocultivo positivo
- D.- Ecocardiografía positiva
- E.- Antecedente de cateterismo cardíaco

66.- Varón de 40 años que hace 48 horas presenta tumoración evidente en región perianal, progresiva e invalidante. El dolor se intensifica al sentarse, caminar y defecar. Al Examen físico: tumoración flogótica y dolorosa a la palpación en región perianal. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- A.- Ecografía partes blandas
- B.- Drenaje quirúrgico
- C.- Proctoscopia urgente
- D.- Anoscopia
- E.- Antibióticoterapia

67.- La fase de control se ejerce por medio de la supervisión, que es un control _____ y por medio de la medición, que es un control _____.

- A.- Cualitativo - cuantitativo
- B.- administrativo - matematico
- C.- preciso - temporal
- D.- evaluativo - numerico
- E.- flexible - rigido

68.- ¿Cuál es el primer marcador que se presenta en Hepatitis B?

- A.- el anti HBs
- B.- anti HBa
- C.- HBsAg
- D.- Anti HBe
- E.- el anticuerpo IgM

69.- De las siguientes entidades patológicas. ¿Cuál es la causa más frecuente del síndrome de ojo rojo?

- A.- Herpes ocular
- B.- Conjuntivitis bacteriana
- C.- Queratitis aguda
- D.- Hemorragia subconjuntival
- E.- Conjuntivitis alérgica

70.- ¿Cuál de las siguientes células son fagocíticas primarias en sangre periférica?

- A.- Neutrófilos
- B.- Macrófagos
- C.- Linfocitos
- D.- Eosinófilos
- E.- Monocitos

71.- En un paciente con neumonía extrahospitalaria ¿Qué características debe tener una muestra de esputo x campo para ser cultivo?

- A.- > 25 neutrófilos y < 10 células epiteliales
- B.- < 20 neutrófilos y < 20 células epiteliales
- C.- < 5 neutrófilos y > 15 células epiteliales
- D.- > 15 neutrófilos y > 10 células epiteliales
- E.- > 10 neutrófilos y < 20 células epiteliales

72.- Mujer de 50 años, que acude a emergencia por presentar caída sobre la mano hace 30 minutos. Al Examen físico: Deformidad de la muñeca en dorso de tenedor muy dolorosa. ¿Qué tipo de aparato de yeso debe colocarse?

- A.- Antebraquial
- B.- Braquial
- C.- Braquío dedal
- D.- Braquío manual
- E.- Antebraquiomanual

73.- El conjunto organizado e integrado de actividades/tareas de atención a la salud de la mujer, es un

- A.- programa de salud
- B.- protocolo de atención
- C.- proceso de salud
- D.- flujograma de atención
- E.- protocolo de salud

74.- La lesión del subtálamo se manifiesta por:

- A.- Hemiplejía
- B.- Atetosis
- C.- Hemibalismo
- D.- Ataxia
- E.- Acinesia

75.- Adolescente obeso sedentario, con IMC mayor a 3 desviaciones estándar. ¿Que complicación traumatológica puede presentar?

- A.- Xifoesciosis
- B.- Pie equinovaro
- C.- Tibia vara
- D.- Lordosis
- E.- Artrosis de cadera

76.- Varón de 55 años, que acude al servicio de Emergencia por cefalea y sensación nauseosa. Al Examen clínico: PA: 180/120 mmHg, pulso 100'. ¿Cuál es el tratamiento indicado?

- A.- Propanolol
- B.- Hidralazina
- C.- Nitropusiato de sodio
- D.- Metildopa
- E.- Minodixil

77.- Mujer de 32 años, G3 P3003, consulta por presentar secreción sanguinolenta por el pezón de la mama izquierda. Sin antecedentes de ca de mama en la familia. Al Examen físico: no se detecta ninguna tumoración. Cuál es el diagnóstico más probable?

- A.- Mastopatía fibroquística
- B.- Fibroadenoma de mama
- C.- Papiloma intraductal
- D.- Tumor Philodes
- E.- Carcinoma intraductal de la mama

78.- ¿Cómo se denomina al proceso de cicatrización de una herida, por sus propios medios y en el tiempo adecuado?

- A.- Secundario tardío
- B.- Primera intencion
- C.- Primario tardio
- D.- Tercera intencion
- E.- Segunda intencion

79.- ¿Cuál de los siguientes gérmenes es responsable del 80% de las infecciones urinarias en adultos?

- A.- Enterobacter cloacae
- B.- Proteus mirabilis
- C.- Pseudomona aeruginosa
- D.- Escherichia coli
- E.- Klebsiella pneumoneae

80.- Para la implementación de la estrategia sanitaria de alimentación y nutrición saludable se utilizan un conjunto de recursos y habilidades para influir en la opinión pública y movilizar fuerzas para apoyar políticas y propuestas específicas dirigidas a crear un ambiente favorable y una vida saludable. A esto se le conoce como:

- A.- Abogacía
- B.- Prestacion
- C.- Participación
- D.- Provisión
- E.- Organización

81.- Lactante de 4 meses de edad, con rinorrea acuosa, tos leve y febrícula. Al 3er día, fiebre de 40°C, tos perruna, ronquera y estridor inspiratorio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A.- Epiglotitis
- B.- Traqueobronquitis
- C.- Laringitis
- D.- Laringotraqueitis
- E.- Laringotraqueobronquitis espasmódica

- 82.- ¿Cuál de las siguientes alternativas se considera como manejo inicial de las fracturas abiertas o expuestas?**
- A.- Inmovilización con placas y tornillos
B.- Desbridamiento urgente
C.- Fijación con tutores externos
D.- Inmovilización endomedular
E.- Inmovilización con aparato de yeso
- 83.- El líquido pleural obtenido por tóracocentesis tiene características hemáticas. ¿Cuál es la relación en % entre el hematocrito del líquido pleural y la sangre periférica, para confirmar diagnóstico de hemotórax?**
- A.- > 50
B.- > 45
C.- > 30
D.- > 10
E.- > 20
- 84.- Paciente de 45 años que presenta menorragia, metrorragia y dismenorrea. Al Examen ginecológico: sangrado escaso a través de orificio cervical externo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**
- A.- Pólipo endometrial
B.- Cáncer de endometrio
C.- Leiomiomatosis uterina
D.- Enfermedad pélvica inflamatoria
E.- Hemorragia uterina disfuncional
- 85.- ¿Cuál de los antibióticos es más eficaz para el tratamiento de infecciones intestinales causadas por Clostridium difficile?:**
- A.- Vancomicina
B.- Bacitracina
C.- Acido Fusídico
D.- Eritromicina
E.- Nitazoxanida
- 86.- Varon de 65 años, con T: 38 °C , náuseas, vómitos y deposiciones líquidas con moco, sangre y tenesmo. Estando hospitalizado presenta una convulsión por primera vez. ¿Cuál es el agente causal?**
- A.- Entamoeba histolítica
B.- Salmonella
C.- Escherichia colie
D.- Clostridium perfringens
E.- Shiguella
- 87.- Gestante de 35 años con antecedente de dispepsias a los alimentos grasos. Acude a Emergencia por presentar dolor abdominal tipo cólico en hipocondrio derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**
- A.- Quiste de colédoco
B.- Coledocolitiasis
C.- Colecistitis aguda
D.- Colelitiasis
E.- Disquinesia vesicular
- 88.- ¿Cuál de las siguientes patologías cursa con degeneración de las neuronas, que se manifiesta como una combinación de temblor, rigidez muscular, lentitud de movimientos y alteración de la marcha?**
- A.- Ataxia cerebelosa
B.- Enfermedad de Alzheimer
C.- Enfermedad de Parkinson
D.- Demencia senil
E.- Depresión

89.- Se considera Hiponatremia crónica, cuando los síntomas persiste por más de:

- A.- 36 horas
B.- 48 horas
C.- 24 horas
D.- 6 horas
E.- 12 horas

90.- Mujer de 25 años con 16 semanas de gestación, que consulta por dolor abdominal tipo cólico y sangrado vaginal escaso. Al tacto: cérvix blando cerrado, tamaño uterino corresponde a la edad gestacional. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico que acompaña al reposo?

- A.- Progesterona
B.- Antiespasmódicos
C.- Analgésicos
D.- Tocolíticos
E.- Oxitócicos

91.- Mujer de 26 años, con fiebre de 39°C, de 4 semanas de evolución que calma con antipiréticos; fatiga intensa y malestar general. Al Examen físico: Linfadenopatías cervicales, submaxilares y supraclaviculares y hepatoesplenomegalia. Hemograma con 15% de linfocitos atípicos y leve trombocitopenia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A.- Dengue
B.- Fiebre tifoidea
C.- Fiebre Chikungunya
D.- Mononucleosis infecciosa
E.- Tuberculosis pulmonar

92.- Lactante de 8 meses con un día de deposiciones acuosas 8 por día, sin moco ni sangre. Examen físico: Peso: 8 kgs, T: 37.4°C, FR: 48/min., FC 156/min. con tonos cardíacos de intensidad normal, irritable, fontanela anterior deprimida, globos oculares hundidos, ausencia de lágrimas, mucosa oral seca y signo de pliegue: +. El tratamiento inicial con SRO requerirá un volumen de.... ml/hora x 4 horas

- A.- 120
B.- 200
C.- 180
D.- 140
E.- 220

93.- Recién nacido de 5 hrs, con peso: de 2.5 kg y glicemia: de 24 mg/dl. El tratamiento inicial es administración EV, de Dextrosa al...% - ... ml/kg

- A.- 5 - 2
B.- 10 - 2
C.- 10 - 6
D.- 10 - 4
E.- 5 - 6

94.- En un seguimiento por 10 años a 200 varones, 100 con hipertrofia de próstata y 100 sin hipertrofia. En el primer grupo 24 pacientes desarrollaron cáncer de próstata y 5 en el otro. ¿Cuál es el riesgo relativo de la hipertrofia de próstata de desarrollar cáncer?

- A.- 0.20
B.- 2.0
C.- 0.48
D.- 4.8
E.- 0.048

95.- Recién nacido de 5 días presenta cordón umbilical de olor fétido, eritema en la piel circundante y secreción. ¿Cuál es el tratamiento indicado?

- A.- Cefazolina + Ampicilina
B.- Cefazolina + Amikacina
C.- Ampicilina + Vancomicina
D.- Ampicilina + Amikacina
E.- Ampicilina + Ciprofloxacino

96.- Las actividades de prevención y promoción van dirigidas a personas...

- A.- sanas o que se sienten libres de enfermedad
B.- sanas o con leve riesgo de enfermar
C.- sanas o con gran riesgo de enfermar
D.- enfermas o que se sienten enfermas
E.- enfermas o que se sienten libres de enfermedad

97.- Gestante de 27 semanas, acude a la Emergencia por presentar escalofríos, fiebre, náuseas y molestias urinarias. Al Examen clínico: dolor lumbar, T:38°C. Cuál es el diagnóstico más probable?

- A.- Cistitis
B.- Coreoamionitis
C.- Pielonefritis Aguda
D.- Litiásis renal
E.- Apendicitis aguda

98.- Varón de 42 años, con cuadro de EPOC desde hace 10 años de evolución. En su control por consultorio Externo y le diagnostican osteoporosis. ¿Cuál de los siguientes fármacos podría asociarse a esta complicación?

- A.- Glucocorticoides inhalados
B.- Fenoterol
C.- Teofilina
D.- Bromuro de Ipratropio
E.- Glucocorticoides orales

99.- Lactante de un mes, nacido a termino con peso adecuado, alimentado con leche materna. Su madre adolescente refiere "no tener leche". Velocidad de crecimiento: 25 gramos diarios, técnica de lactancia inadecuada. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- A.- Controlar peso cada semana
B.- Indicar fórmula láctea
C.- Indicar mejorar la alimentación materna
D.- Instruir en colocación, agarre y otros
E.- Alentar a continuar lactancia

100.- Mujer de 50 años que acude al servicio de Emergencia por presentar dolor abdominal en cinturón, náuseas y vómitos. Al examen físico: deshidratación severa. Exámenes de laboratorio: glucosa: 250 mg/dl, leucocitos: 6,000; deshidrogenasa láctica: 400 UI/L, calcio: 6 mg/dl, deficiencia de bases > 6 meq/L, descenso de hematocrito > al 10%. De acuerdo con los criterios pronóstico de Ranson, el cuadro corresponde a una pancreatitis...

- A.- moderada
B.- aguda
C.- leve
D.- severa
E.- crónica

1.-C	31.-A	61.-A	91.-D
2.-C	32.-E	62.-E	92.-B
3.-C	33.-E	63.-D	93.-B
4.-E	34.-C	64.-E	94.-D
5.-E	35.-A	65.-D	95.-D
6.-D	36.-C	66.-B	96.-A
7.-B	37.-A	67.-A	97.-C
8.-A	38.-B	68.-C	98.-E
9.-C	39.-C	69.-B	99.-E
10.-A	40.-D	70.-A	100.-D
11.-C	41.-C	71.-A	
12.-A	42.-E	72.-D	
13.-C	43.-E	73.-A	
14.-E	44.-E	74.-C	
15.-E	45.-D	75.-C	
16.-A	46.-D	76.-C	
17.-C	47.-C	77.-C	
18.-B	48.-D	78.-E	
19.-D	49.-B	79.-D	
20.-E	50.-E	80.-A	
21.-C	51.-D	81.-D	
22.-D	52.-B	82.-B	
23.-C	53.-C	83.-A	
24.-C	54.-C	84.-A	
25.-D	55.-E	85.-A	
26.-E	56.-D	86.-E	
27.-B	57.-B	87.-D	
28.-D	58.-A	88.-C	
29.-B	59.-B	89.-B	
30.-A	60.-B	90.-B	